

BULETIN METEOROLOGI

Edisi Mei 2026

Analisis Cuaca
April 2026

Analisis Dinamika Atmosfer
April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buletin Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura edisi Mei 2026.

Buletin Evaluasi Cuaca untuk wilayah Trunojoyo - Sumenep dan sekitarnya ini dibuat sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi di bidang Meteorologi. Buletin edisi Mei 2026 ini menggambarkan keadaan cuaca yang teramati di Stasiun Meteorologi Trunojoyo pada bulan April 2025.

Kami menyadari bahwa buletin ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan yang bersifat membangun akan sangat kami butuhkan guna menjadikan terbitan mendatang menjadi lebih baik. Harapan kami, kiranya buletin ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Sekian terima kasih.



Sumenep, Mei 2026

Kepala Stasiun Meteorologi
Trunojoyo

Ari Widjajanto, SP. MT.
NIP. 197103261992021001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
HASIL PENGAMATAN CUACA BULAN APRIL 2026	1
OBSERVASI SUHU UDARA	1
OBSERVASI KELEMBABAN UDARA	3
OBSERVASI TEKANAN UDARA	5
OBSERVASI ARAH DAN KECEPATAN ANGIN PERMUKAAN	7
OBSERVASI CURAH HUJAN	9
OBSERVASI PENGUAPAN	10
OBSERVASI PENYINARAN MATAHARI	11
KEADAAN CUACA	13
DINAMIKA ATMOSFER	14
KESIMPULAN	24

Tim Penyusun Buletin

Penasihat/Penanggung Jawab : Ari Widjajanto, SP, MT.

Redaktur : 1. Radibyo Trihastyo, S.Tr.
2. Iqbal Zuhdi Vanani, S.Tr. Met.
3. Moh. Rizaldi Ainur Rahman, S.Tr. Met.
4. Ahmad Dzakiyyurayhan Huda, S.Tr.Met
5. Imelia Nurul Hasanah, S.Tr.Met

Editor : 1. Ruslan Hartoyo, S.Tr.
2. Dheajeng Margaretha, S.Tr. Inst.

Pencetakan : -

HASIL PENGAMATAN CUACA BULAN APRIL 2026 STASIUN METEOROLOGI TRUNOJOYO


Data Parameter Stasiun Meteorologi Trunojoyo Sumenep dapat disajikan sebagai berikut :

I. OBSERVASI SUHU UDARA

Pengamatan suhu udara dilakukan setiap jam dengan menggunakan alat Thermometer Air Raksa yang diletakkan dalam tempat berventilasi sehingga terlindung dari sinar atau radiasi matahari langsung yang biasa disebut sangkar meteorologi. Hasil pengamatan dan pencatatan suhu selama bulan April 2026 sebagai berikut :


Variasi suhu udara rata-rata tiap jam di Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura bulan April 2026 berkisar antara 25,3 °C – 30,9 °C. Pola harian suhu udara rata-rata menunjukkan bahwa di jam 00.00 UTC atau 07.00 WIB sebesar 27,0 °C kemudian naik hingga mencapai nilai tertinggi pada jam 04.00 UTC atau 11.00 WIB sebesar 30,9 °C, kemudian berangsur turun hingga jam 22.00 UTC / jam 05.00 WIB sebesar 25,3 °C.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Variansi suhu udara harian selama periode bulan April 2026 berkisar antara 26,2 °C – 29,3 °C. Suhu udara tertinggi terjadi pada tanggal 24 April 2026 sebesar 29,3 °C dan suhu udara terendah terjadi pada tanggal 30 April 2026 sebesar 26,2 °C.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :


No.	Uraian	Nilai Statistik
1	Suhu udara rata-rata	27,2
2	Suhu udara maksimum rata-rata	30,7
3	Suhu udara minimum rata-rata	24,5
4	Suhu udara maksimum absolut	33,0
5	Suhu udara minimum absolut	24,3
6	Standart deviasi	2,267875319
7	Kemiringan data	0,279525438
8	Kesimetrisan data	-1,187897636
9	Nilai ekstrem > 35 °C	-
10	Jumlah data	720

II. OBSERVASI KELEMBAPAN

Kelembapan udara diukur dengan alat Pycrometer. Pycrometer terdiri dari 2 (dua) Thermometer Air Raksa yaitu : Thermometer Bola Kering dan Thermometer Bola Basah. Pycrometer diletakkan dalam Sangkar Meteorologi setinggi ± 2 m. Kelembapan udara yang diukur adalah Lembab Nisbi (Relative humidity / RH) yaitu : perbandingan antara massa uap air yang ada dengan massa uap air jenuh dalam udara tersebut. Satuan yang dipakai adalah %.

Variasi kelembapan udara rata-rata tiap jam bulan April 2026 di Stasiun Meteorologi Trunojoyo berkisar antara 69 % - 92 %. Pola harian kelembapan udara rata-rata menunjukkan bahwa di jam 00.00 UTC atau 07.00 WIB sebesar 88 % kemudian turun hingga mencapai nilai terendah pada jam 04.00 UTC atau 11.00 WIB sebesar 69 % dan kemudian berangsur naik terus hingga jam 21.00 UTC atau 04.00 WIB sebesar 92 %.


Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Variasi kelembapan udara harian bulan April 2026 di Stasiun Meteorologi Trunojoyo berkisar antara 52 % - 96 %. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada tanggal 30 April

2026 sebesar 96 % dan kelembapan udara terendah terjadi pada tanggal 18 April 2026 sebesar 52 %.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :


No.	Uraian	Nilai Statistik
1.	Kelembapan udara rata-rata	82 %
2.	Kelembapan udara maksimum rata-rata	92 %
3.	Kelembapan udara minimum rata-rata	69 %
4.	Kelembapan udara maksimum absolut	96 %
5.	Kelembapan udara minimum absolut	52 %
6.	Standart deviasi	10,64228217
7.	Kemiringan data	-0,489457037
8.	Kesimetrisan data	-0,824752155
9.	Nilai ekstrem < 40 %	-
10.	Jumlah data	720

III. OBSERVASI TEKANAN UDARA

Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di Stasiun Meteorologi Trunojoyo adalah Barometer Digital. Satuan yang digunakan adalah milibar.

Variasi tekanan udara rata-rata tiap jam bulan April 2026 di Stasiun Meteorologi Trunojoyo berkisar antara 1007,5 mb – 1011,2 mb. Pola harian tekanan udara rata-rata menunjukkan bahwa di jam 00.00 UTC atau 07.00 WIB sebesar 1010,8 mb kemudian naik sampai jam 01.00 UTC atau 08.00 WIB sebesar 1011,1 mb kemudian turun hingga mencapai nilai terendah sebesar 1007,5 mb pada jam 08.00 UTC atau 15.00 WIB dan kemudian berangsur naik kembali hingga mencapai nilai sebesar 1011,0 mb pada jam 14.00 UTC atau jam 21.00 WIB. Selanjutnya akan berangsur turun hingga mencapai nilai sebesar 1009,3 mb pada jam 21.00 UTC atau 04.00 WIB kemudian naik lagi hingga mencapai nilai sebesar 1010,2 mb pada jam 23.00 UTC atau 06.00 WIB.


Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Variasi tekanan udara harian bulan April 2026 di Stasiun Meteorologi Trunojoyo berkisar antara 1006,2 mb – 1012,6 mb. Tekanan udara tertinggi terjadi pada tanggal

9, 11, dan 13 April 2026 sebesar 1012,6 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada tanggal 28 April 2026 sebesar 1006,2 mb.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :


No.	Uraian	Nilai Statistik
1.	Tekanan udara rata-rata	1009,7 mb
2.	Tekanan udara maksimum rata-rata	1011,5 mb
3.	Tekanan udara minimum rata-rata	1007,5 mb
4.	Tekanan udara maksimum absolut	1012,6 mb
5.	Tekanan udara minimum absolut	1006,2 mb
6.	Standart deviasi	1,462393283
7.	Kemiringan data	-0,096319441
8.	Kesimetrisan data	-0,6321796
9.	Jumlah data	720

IV. OBSERVASI ARAH DAN KECEPATAN ANGIN PERMUKAAN

a. Arah Angin


Alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin permukaan di Stasiun Meteorologi Trunojoyo adalah Anemometer.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang arah dan kecepatan angin yang terjadi pada bulan April 2026 digunakan dalam gambar mawar angin (Windrose) seperti yang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.



Dari gambar di atas dapat diketahui arah angin terbanyak bertiup dari arah Tenggara dengan jumlah kejadian sebanyak 194 kejadian dengan frekuensi sebesar 26,9 %, angin dari arah Timur Laut sebanyak 79 kejadian dengan frekuensi sebesar 10,97 %, angin dari arah Barat Daya sebanyak 79 kejadian dengan frekuensi sebesar 10,97 %, angin dari arah Barat Laut sebanyak 30 kejadian dengan frekuensi sebesar 4,16 %, angin dari arah Timur Laut sebanyak 28 kejadian dengan frekuensi sebesar 5,24 %, angin dari arah Barat Barat Daya sebanyak 21 kejadian dengan frekuensi sebesar 2,91 %, angin dari arah Selatan Barat Daya sebanyak 9 kejadian dengan frekuensi sebesar 1,25 %.


b. Kecepatan Angin



Kecepatan angin dominan kelompok kecepatan (Calm) Knots dengan frekuensi sebesar 31,9 %. Kelompok kecepatan (0,97 – 4,08) Knots dengan frekuensi sebesar 30,4 %. Kemudian kelompok (4,08 – 7,00) dengan frekuensi sebesar 24,7 %. Kemudian kelompok (7,00 – 11,08) dengan frekuensi sebesar 11,8 %. Kemudian kelompok (11,08 – 17,11) dengan frekuensi sebesar 0,8 %. Kemudian kelompok (17,11 – 21,58) dengan frekuensi sebesar 0,0 %. Kemudian kelompok (> 21,58) dengan frekuensi sebesar 0,1 %.

Kecepatan angin rata-rata sebesar 2,9 Knots atau 5,37 km/jam. Kecepatan angin rata-rata tertinggi sebesar 6,7 Knots atau 12,40 km/jam sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah sebesar 0,9 Knots atau 1,66 km/Jam.

Sedangkan kecepatan angin maksimum tercatat sebesar 15 Knots atau 37,8 km/jam yang terjadi pada tanggal 13 dan 29 April 2026. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Statistik
1.	Kecepatan angin rata-rata	2,9 Knots
2.	Kecepatan angin maksimum rata-rata	6,7 Knots
3.	Kecepatan angin maksimum absolut	15 Knots
4.	Standart deviasi	2,83925461
5.	Kemiringan data	1,006230184
6.	Kesimetrisan data	2,596276903
7.	Nilai ekstrem > 25 Knots	0
8.	Jumlah data	720

V. OBSERVASI CURAH HUJAN

Pengamatan curah hujan di Stasiun Meteorologi Trunojoyo menggunakan alat Penakar Hujan Observasi (obs) dan Penakar Hujan Otomatis type Hellman. Penakar hujan Observasi (obs) adalah alat pengukur jumlah curah hujan tipe biasa, sedangkan Penakar Hujan type Hellman adalah alat pengukur intensitas hujan atau jumlah curah hujan per satuan waktu. Curah hujan diukur dalam satuan mm (milimeter). Curah hujan selama Bulan April 2026 sebesar 174 mm / 15 hari hujan




VI. OBSERVASI PENGUAPAN

Penguapan air diukur di Stasiun Meteorologi Trunojoyo dengan menggunakan alat yang terdiri dari Bejana yang biasa disebut Panci Penguapan sebagai penampung air dengan diameter 127 cm, Hook Gauge stell Weel yaitu alat pengukur tinggi permukaan air dalam panci, Untuk mengetahui jumlah penguapan yang terjadi digunakan alat pengukur yaitu Open Pan Evaporimeter Klas A dengan penutup kisi - kisi.

Rata – rata Penguapan selama bulan April 2026 sebesar 5.0 mm. Penguapan tertinggi bulan April 2026 sebesar 10.3 mm terjadi pada tanggal 18 April 2026 sedangkan penguapan terendah sebesar 0 mm terjadi pada tanggal 29 April 2026.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :


No.	Uraian	Nilai Statistik
1.	Penguapan rata-rata	5.0 mm
2.	Penguapan tertinggi	10,3 mm
3.	Penguapan terendah	0 mm
4.	Standart deviasi	2,7
5.	Kemiringan data	0,124815083
6.	Kesimetrisan data	-0,327
7.	Jumlah data	30

VII. OBSERVASI PENYINARAN MATAHARI

Dengan menggunakan pias yang dipasang pada alat Campbell Stokes dapat diketahui berapa lama matahari bersinar tanpa terhalang apapun yang dihitung dari panjang jejak hasil pembakaran di pias.

Rata-rata lama penyinaran matahari selama bulan April 2026 sebesar 32,9 %. Lama penyinaran matahari tertinggi sebesar 100 % dan terendah 0 %.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.




Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Statistik
1.	Lama penyinaran matahari rata-rata	32,9 %
2.	Lama penyinaran matahari tertinggi	100 %
3.	Lama penyinaran matahari terendah	0 %
4.	Pias tidak terbakar sama sekali	2
5.	Standart deviasi	34,1
6.	Kemiringan data	-0,948
7.	Kesimetrisan data	-0,340
8.	Jumlah data	30


VIII. KEADAAN CUACA

Keadaan cuaca selama bulan April 2026 di Stasiun Meteorologi Trunojoyo terjadi 10 kali guntur disertai hujan, 7 kali guntur saja, 9 kali hujan tanpa guntur, 2 kali Precipitation, 0 kali Haze dan yang terakhir 0 kali terjadi Lightning.



IX. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER

1.1 El-Nino Southern Oscillation (ENSO)



Gambar 1. (a) El Nino, (b) ENSO-netral, dan (c) La Nina

(Sumber: www.bmkg.go.id)


El Nino Southern Oscillation (ENSO) didefinisikan sebagai anomali suhu permukaan laut (SPL) yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya di Samudra Pasifik tropis tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca di Samudra Pasifik. *ENSO* terbagi dalam 3 fase, yaitu: fase netral, fase *el nino* dan fase *la nina*,

Selama periode ENSO netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik seperti pada gambar 1(b). Oleh sebab itu, tekanan udara di atas Samudra Pasifik bagian Barat menjadi lebih rendah daripada Samudra Pasifik bagian timur. Hal ini menyebabkan udara lembab yang hangat naik. Di atas Pasifik ekuatorial timur yang lebih dingin, tekanan permukaan yang lebih tinggi menyebabkan udara yang lebih dingin turun. Udara bergerak dari tekanan tinggi di wilayah timur ke tekanan yang lebih rendah di bagian barat. Beda tekanan ini menyebabkan terbentuknya angin pasat. Angin pasat berhembus dari timur ke arah barat melintasi Samudra Pasifik menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat dan disebut dengan Sirkulasi Walker.

Selama fase *El Nino*, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan, dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan risiko kekeringan. Sebaliknya *La Nina* adalah kondisi dimana terjadi penurunan suhu muka laut di bagian timur ekuator di Samudra Pasifik ditandai dengan anomali suhu muka laut lebih dingin dari rata-ratanya di Ekuator Pasifik tengah. Di


Indonesia, curah hujan cenderung meningkat. Secara umum, semakin dingin anomali suhu laut maka La Nina akan semakin kuat dan begitu pula sebaliknya.

Untuk pemantauan fase ENSO, salah satunya dapat diketahui melalui nilai indeks Niño. Berdasar kriteria oleh BoM (Bureau of Meteorology Australia) Niño3.4 bulanan yang berkelanjutan di atas +0,8 °C terkait dengan El Nino, dan nilai di bawah -0,8 °C dikaitkan dengan La Niña.



Gambar 2. Indeks Nino 3.4
 (Sumber: www.bom.gov.au)

Indeks Nino 3.4 selama bulan April memiliki nilai berkisar -0.35 hingga 0.39. Grafik Nino 3.4 menunjukkan pola kecenderungan kenaikan. Melalui grafik tersebut, dapat diketahui bahwa pada April ENSO berada dalam *fase ENSO neutral*. *Fase ENSO neutral* yang terjadi tidak berpengaruh terhadap penambahan curah hujan di wilayah Jawa Timur.



Gambar 3. Model Prediksi ENSO


(Sumber: www.bom.gov.au)

Prediksi Nino 3.4 selama Mei 2026 hingga Oktober 2026 memiliki nilai berkisar 1.1°C hingga 2.8°C. Prediksi *ENSO fase positive (El Niño)* akan berlangsung saat April hingga Oktober dengan probabilitas mencapai 100%. Probabilitas terjadinya *ENSO fase neutral* maupun *fase negative (Lanina)* pada periode tersebut sebesar 0%.

1.2 Dipole Mode Index (DMI)


Indian Ocean Dipole (IOD) didefinisikan dengan adanya anomali perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia tropis bagian timur dan barat. Fase positif terjadi apabila anomali suhu muka laut di Samudera Hindia bagian barat relatif lebih tinggi yang menyebabkan adanya peningkatan aktivitas konvektif di daerah tersebut dan menarik massa udara di sebelah timur yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Samudera Hindia bagian timur. Sebaliknya pada fase negative menyebabkan peningkatan curah hujan di Samudera Hindia bagian timur.

Untuk pemantauan fase IOD, salah satunya dapat diketahui melalui nilai *Dipole Mode Index (DMI)*. *Dipole Mode Index* diperoleh dari perbedaan suhu muka laut antara wilayah barat dan timur di Samudra Hindia. Berdasar kriteria oleh BoM (Bureau of Meteorology Australia) DMI bulanan yang berkelanjutan di atas +0,4 °C terkait dengan IOD positif, dan nilai di bawah -0,4 °C dikaitkan dengan IOD negatif.



Gambar 4. Indeks DMI
 (Sumber: www.bom.gov.au)

Nilai Indeks *Dipole Mode* selama April berkisar -0.14 hingga 0.01. Grafik Nilai Indeks *Dipole Mode* cenderung menunjukkan pola kenaikan. Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa pada April dipole mode berada dalam *fase neutral*. *Fase neutral IOD* tidak berpengaruh terhadap pengurangan maupun penambahan curah hujan di wilayah Jawa Timur.




Gambar 5. Prediksi Indeks DMI
 (Sumber: www.bom.gov.au)

Prediksi *Dipole Mode* selama Mei 2026 hingga Oktober 2026 berkisar 0.2 hingga 0.5. Prediksi *Dipole Mode neutral* akan berlangsung pada Mei hingga Juni dengan probabilitas lebih dari 64%. Prediksi *Dipole Mode positive* akan berlangsung pada Juli dan Oktober dengan Probabilitas lebih dari 60%. Pada periode tersebut, probabilitas terjadinya *Dipole Mode neutral* cukup tinggi dan *Dipole Mode negative* sangat rendah, yaitu kurang dari 2% untuk *Dipole Mode negative* dan 38% untuk *Dipole Mode neutral*. Pada Periode Agustus hingga September, Probabilitas *Dipole Mode neutral* dan *Dipole Mode positive* berada di nilai yang berdekatan.

1.3 SOI (Southern Oscillation Index)

SOI adalah pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama fenomena El Nino dan La Nina. Nilai dari indeks SOI diambil berdasarkan perbedaan tekanan udara permukaan laut antara Tahiti dan Darwin. SOI merupakan nilai indeks osilasi selatan yang dapat menunjukkan fenomena El Nino. El Nino terjadi jika nilai dari indeks SOI bernilai negatif dalam jangka waktu minimal 3 bulan sedangkan fenomena La Nina terjadi apabila nilai dari indeks SOI bernilai positif yang biasanya bernilai diatas +7 dalam jangka waktu minimal 3 bulan. Nilai SOI merupakan indikator yang baik terhadap curah hujan di wilayah Asia Tenggara. Ditandai dengan angin pasat di wilayah Samudera Pasifik menguat dan terjadi peningkatan suhu di Utara Australia dan Indonesia bagian Timur. Hal ini berdampak pada penurunan suhu di wilayah bagian Tengah dan Timur Pasifik sehingga meningkatkan kemungkinan kenaikan kelembaban di wilayah Barat (Indonesia dan Australia).




Gambar 6. Indeks SOI – 30 Harian

(Sumber : www.bom.gov.au)

Indeks SOI pada awal bulan Mei 2026 bernilai -9.7. Nilai tersebut menunjukkan terjadinya fenomena El-Nino lemah hingga menengah di pertengahan bulan Mei sehingga menyebabkan tidak ada peningkatan aktivitas potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia karena ENSO.


1.4 Angin Gradien 850 mb



Gambar 7. Angin lapisan 850 mb di Wilayah Indonesia Dasarian III April 2026 dan Prediksi Angin 850 mb di Wilayah Indonesia Dasarian I Mei 2026

(Sumber : www.bmkg.go.id)

Aliran massa udara di sebagian besar Indonesia didominasi angin timuran. Secara umum tidak ada belokan angin dan pola pusat tekanan rendah yang terlihat di Indonesia. Prediksi pada Dasarian I Mei 2026 adalah angin timuran diprediksi aktif. Belokan angin diprediksi terjadi di sekitar wilayah ekuator.




Gambar 8. Indeks Monsun Asia dan Indeks Monsun Australia di Wilayah Indonesia
(Sumber : www.bmkg.go.id)

Pada Dasarian III April 2026, Monsun Asia aktif dan diprediksi terus aktif hingga Dasarian II Mei 2026 dengan intensitas yang hampir sama dengan normalnya. Sementara itu, Monsun Australia sudah aktif sejak Dasarian I April 2026 dan diprediksi terus aktif dengan intensitas Monsun Australia yang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan klimatologisnya pada Dasarian I dan II Mei 2026.

1.5 Madden Julian Oscillation (MJO)

Madden Julian Oscillation adalah suatu gelombang atau osilasi sub musiman yang terjadi di lapisan troposfer wilayah tropis, akibat dari sirkulasi sel skala besar di ekuatorial yang bergerak dari barat ke timur yaitu dari laut Hindia ke Pasifik Tengah dengan rentang daerah propagasi 15° LU – 15° LS. MJO secara alami terbentuk dari egati interaksi laut dan atmosfer, dengan periode osilasi kurang lebih 30-60 hari. Pergerakan MJO dibagi menjadi 8 fase. Fase-1 di Afrika (210° BB-60° BT), fase-2 di Samudera Hindia bagian Barat (60° BT-80° BT), fase-3 di Samudera Hindia bagian Timur (80° BT-100° BT), fase-4 dan fase-5 di Benua Maritim Indonesia (100° BT-140° BT), fase-6 di Pasifik Barat (140° BT-160° BT), fase-7 di Pasifik Tengah (160° BT-180° BT), dan fase-8 di Pasifik Timur (180° BT-160° BB). MJO memiliki dua fase, yaitu fase basah yang menyebabkan banyak terbentuknya awan penghasil hujan dan disusul dengan fase kering yang mengakibatkan awan konvektif sulit terbentuk.


Ketika MJO berada dalam fase aktif, terjadi peningkatan intensitas curah hujan yang tinggi terhadap wilayah yang dilaluinya. Hal tersebut terjadi karena daerah yang dilalui MJO suhu muka lautnya meningkat seiring dengan perjalanan arus laut ke timur sehingga berdampak pada tingginya penguapan air laut. Tidak semua fase MJO aktif di Indonesia lantas diikuti oleh kejadian hujan lebat karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi tersedianya suplai uap air menuju ke Indonesia, seperti El Nino / La Nina dan Dipole Mode.



Gambar 9. Pergerakan MJO 26 Maret 2026 – 4 Mei 2026 (kiri) dan Total Rata-rata dan Anomali OLR

4 April 2026 – 4 Mei 2026 (kanan) (sumber: www.bom.gov.au)

Pergerakan MJO pada bulan April 2026 yang ditunjukkan oleh garis hijau pada gambar 9 memperlihatkan bahwa pada bulan April 2026 MJO mulai terlihat aktif di fase 6 dan netral. Dalam hal ini MJO tidak memiliki dampak pada pertumbuhan awan yang signifikan di wilayah Indonesia.



Gambar 10. Prediksi posisi MJO dan Anomali OLR Dasarian II April 2026 – Dasarian III

April 2026


(sumber: www.bmkg.go.id)

Outgoing Longwave Radiation (OLR) adalah energi yang meninggalkan bumi dalam bentuk radiasi inframerah pada energi rendah. Nilai OLR dipengaruhi oleh awan dan debu di atmosfer. Makin tinggi nilai OLR maka atmosfer dalam keadaan cerah, sebaliknya makin rendah nilai OLR maka atmosfer dalam keadaan tertutup awan atau debu. Nilai $OLR < 220 \text{ W/m}^2$ mengindikasikan adanya “*deep cloud*” yang menunjukkan kemungkinan terjadinya hujan. Berdasarkan gambar 10 nilai total OLR di seluruh wilayah Indonesia berkisar antara $180\text{-}260 \text{ W/m}^2$ dengan anomali -5 hingga 35 W/m^2 dan di wilayah Jawa Timur sekitar $240\text{-}260 \text{ W/m}^2$ dengan nilai anomali 15 hingga 25 W/m^2 . Keadaan nilai OLR dan anomalnya di wilayah Jawa Timur menunjukkan radiasi yang keluar dari bumi lebih sedikit yang menandakan awan cenderung sedikit. Analisis pada dasarian II April 2026 menunjukkan MJO aktif di fase 8 hingga 1 (West. Hem and Africa) lalu diprediksi terus aktif pada dasarian III di fase 2 (Indian Ocean). Secara spasial gelombang-gelombang atmosfer diprediksi tidak aktif di wilayah Indonesia terutama tengah hingga akhir dasarian III April 2026.

1.6 Suhu Permukaan Laut/Sea Surface Temperature (SST)


Suhu muka laut sangat bergantung pada jumlah cahaya yang diterima dari sinar matahari. Daerah-daerah yang menerima sinar matahari terbanyak adalah daerah yang berada ada lintang 0° oleh karena itu suhu air laut tertinggi adalah di equator. Suhu muka laut di perairan Indonesia dapat digunakan sebagai indeks banyaknya massa udara pembentuk awan di atmosfer. Jika suhu muka laut dingin maka uap air di atmosfer menjadi berkurang, sebaliknya jika suhu muka laut panas maka uap air di atmosfer menjadi banyak.

Nilai positif pada anomali SST mengindikasikan bahwa perairan tersebut mempunyai suhu lebih hangat daripada normalnya sehingga dapat meningkatkan tersedianya massa udara pembentuk awan konvektif. Sebaliknya nilai negatif mengindikasikan bahwa perairan tersebut mempunyai suhu yang lebih dingin dibandingkan normalnya dan mengurangi peluang tersedianya massa udara penghasil awan hujan di wilayah tersebut.



Gambar 11. Anomali SST Dasarian II April 2026 (sumber: www.bmkg.go.id)

Gambar 11 memperlihatkan bahwa rata-rata anomali suhu muka laut di Sebagian besar perairan Indonesia dalam kondisi normal hingga hangat. Sedangkan wilayah perairan Selatan Jawa dan sekitar Maluku lebih dingin.



Gambar 12. Prediksi Anomali Mei 2026 – Oktober 2026 (sumber: www.bmkg.go.id)

Prediksi Anomali SST yang ditunjukkan pada gambar 12 memperlihatkan bahwa pada Juni 2026 hingga November 2026, Anomali SST Perairan Indonesia periode Mei hingga Desember 2026, diprediksi akan didominasi oleh Normal hingga anomali negative (lebih dingin) dengan kisaran nilai -0.5 hingga 0.2 °C.

**KESIMPULAN HASIL PENGAMATAN CUACA
STASIUN METEOROLOGI TRUNOJOYO
BULAN APRIL 2026**

1. Suhu udara berkisar antara 25,3 °C - 30,9 °C dengan rata-rata 27,2°C.
2. Kelembapan udara berkisar antara 69 % - 92 % dengan rata-rata 82 %.
3. Tekanan udara berkisar antara 1007,5 mb - 1011,2 mb dengan rata-rata 1009,7 mb.
4. Arah angin terbanyak dari arah Tenggara dengan frekuensi 29,4 % dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 2,9 Knots atau 5,43 km/jam.
5. Selama bulan April 2026 curah hujan sebesar 174 mm / 15 hari hujan
6. Penguapan berkisar antara 0 mm - 10.3 mm dengan rata-rata 5,0 mm.
7. Lama penyinaran matahari sebesar 0 - 100 % dengan rata-rata 32,9 %.
8. Keadaan cuaca selama bulan April 2026 cuaca yang signifikan 10 kali TSRA, 7 kali TS, 9 kali hujan tanpa TS, 2 kali precipitation, 0 kali Haze dan 0 kali Lightning.